

EC FERTİLİZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
BETAMAX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Suda Çözünür Bor (B)	%6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%11
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5

BETAMAX
Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN Uygulama Doz gr/100 lt su	TOPRAKTAN Uygulama Doz gr/da
ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan 15 gün sonra renklenmeye kadar	50 – 100 gr	100- 300 gr
KAYISI, ŞEFTALİ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
BAĞ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlk yapraktan 15 gün sonra 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100 – 200 gr
DOMATES, BİBER	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
LAHANA, BROKOLİ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KARNİBAHAR	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
ŞEKERPANCARI	6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra	50 – 100 gr	100-300 gr-
AYÇİÇEĞİ VE MISIR	15-25 cm boyda iken	50-100 gr	100-300gr
PATATES-SOĞAN	Dikimden 3 -4 hafta sonra başlayarak15 gün ara ile devam edilir	50-100gr	100-300 gr
KESME ÇİÇEKÇİLİK	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlkbahar döneminde 2.Uygulama: Eksiklik belirtileri ilk görünmeye başladığında	100 – 150 gr	200 – 500 gr
MEYVE FIDANLARI	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
NARENCİYE	2 – 3 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Tomurcuk oluşumunda 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 3.Uygulama: Meyve tutumundan sonra	50 – 100 gr	100- 300 gr
MUZ	Meyve salkımının doğum sürecinden iki ay önce bir ay aralıklarla 2. uygulama	-	500 – 1000 gr
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme dönemi ve dane dolun döneminde	50 – 100 gr	-
FINDIK	Yaprak oluşumundan ve takiben 1 ay sonra	200 – 250 gr	

Betamax, Bor-Çinko-Mangan besin elementlerinin optimum uyumu ile tasarlanan özel bir mikro element karışım gübresidir. Gübrelemeden maximum etki alınabilmesi için bu elementler aminoasit ve organik asitler ile şelatlıdır. Çözünürlüğü maximum seviyede bir gübredir. Özellikle pancar gibi yumrulu bitkilerde öz çürüklüğünü gidermede ve poları artırmada eşsiz bir üründür. Sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında çiçeklenme döneminde ve hasattan sonra uygulamalarda üründe rekolteyi artırır. Meyve bozukluğunu önler. Bitkinin fotosentez kapasitesini artırır. Elmada yıldız oluşumunu teşvik eder. Buğdayda ot ilacı ile birlikte atılması tavsiye edilir. Hububatta kardeşlenmeyi artırır. Mısırdaki tane dolununu teşvik eder.