

**EC FERTİLİZER**  
**ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ**  
**(Çinko Nitrat İçerikli)**  
**ZINC PLUS**

| <b>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</b> | <b>WW</b> |
|------------------------------|-----------|
| Suda Çözünür Çinko (Zn )     | %10       |

**ZINC PLUS**  
**Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı**

| <b>BİTKİ</b>   | <b>UYGULAMA ZAMANI</b>   | <b>YAPRAKTAN</b>          | <b>TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE</b> |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
| DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR                      | Fide dikiminden sezon sonuna kadar her sulamada uygulanır.   | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| KAVUN, KARPUZ, KABAK                                 | 2-4 yaprak döneminde ve bir hafta arayla 2. uygulama yapılır.  | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| ÇİLEK  | Yeşil göz döneminde uygulanır. Beyaz göz döneminde ve hasat sonrası tekrar gelişme döneminde uygulanır.                              | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| BAĞ, KİVİ  | Tomurcuklanma döneminde ve meyve tutum döneminde uygulanır.  | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| MUZ  | Gelişim dönemi boyunca uygulanır.  | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| NARENCİYE  | İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulanır. Aşırı noksanlıklarda 10-14 gün ara ile tekrarlanır.                             | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| MEYVA AĞAÇLARINDA                                    | Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken uygulanır. Meyve tutumundan hasata 1 ay kalana kadar 2-3 hafta arayla ve hasat sonrası uygulanır. | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| ZEYTİN   | Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken uygulanır.   | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| MISIR  | 3-8 yaprak dönemi ve aşırı noksanlık görüldüğünde uygulanır.   | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ                        | 1.Uygulama Bitki çıkışından 2 hafta sonra<br>2.Uygulama birinci uygulamadan 1 hafta sonra  | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA                         | Kardeşlenme döneminde uygulanır.   | 200-250 cc / da 100 lt su | -                                   |
| PAMUK AYÇİÇEĞİ                                       | Çıkıştan 3-4 hafta sonra uygulanır.  | 150-200 cc / da 100 lt su | 400-600 cc /da 1 ton su ile         |
| FASULYE, NOHUT, MERCİMEK                             | Gelişim dönemi boyunca uygulanır.  | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| SOĞAN, SARIMSAK                                      | Gelişim dönemi boyunca uygulanır.  | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI                         | Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken uygulanır.   | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.) | Gelişim dönemi boyunca uygulanır.  | 200-250 cc / da 100 lt su | 500-750 cc /da 1 ton su ile         |
| YEŞİL ALANLAR, KEŞME ÇİÇEKÇİLİK                      | Yetiştirme dönemi boyunca uygulanır.   | 100-200 cc / da 100 lt su | 350-500 cc /da 1 ton su ile         |

Zinc Plus; etkinliği en üst seviyede olacak şekilde tasarlanmış özel bir biyostimulant çinko kaynağıdır. Formülasyondaki nitrat anyonu, organik asit ve aminoasit sayesinde bitkiye çok hızlı tesir eder. Bitkiye uygulandığında fotosentezi uyarır, yaprak ayasını genişletir, bitkiye ön bağışıklık kazandırır. Bütün meyve ağaçlarında ve tarla-sera bitkilerinde çiçeklenme aktivitelerini artırır. Bitkinin yeşil aksamını doğrudan olumlu

etkiler. Kalsiyumlu gbreler ile birlikte rahatlıkla karışır. Yapraktan ve damlama ile gvenle uygulanabilir. Yapraktan uygulamalarda bitkinin dođal oksin hormonunun salgılanmasını sađlar. Yeni dikilen meyve ađaçlarında boyca uzamaya katkı sađlar. Buđdaygillerde kardeşlenme ve glutein artışı sađlar. Pancarda yaprak ayasını genişlettiđi için fotosentez kapasitesini artırarak yumru bymesini teřvik eder.